

# ВРАЧ

ежемесячный научно-практический и публицистический журнал


Издается с мая 1990 года

№ 7

XIX век



XX век



Авторитет и традиции – из века в век

XXI век



- Основы профилактики инсульта в современной клинической практике
- Стратегия эпидемиологических исследований и оценка риска в медицине труда
- Хронические профессиональные заболевания, обусловленные воздействием наиболее распространенных органических растворителей
- Подагрическая нефропатия: диагностика, подходы к лечению
- Метаболический синдром и псориаз
- Диагностика и лечение посттравматических диафрагмальных грыж
- Клиническое наблюдение: гангренозная пиодермия
- Панникулит: особенности течения и исходов
- Отдельные методы восстановительной терапии при остеоартрите

июль

2018

том 29

7. Ланкин В.З., Тихазе А.К., Беленков Ю.Н. Антиоксиданты в комплексной терапии атеросклероза: *pro et contra* / М., 2003; 40 с.
  8. Физиотерапия и курортология. Книга II. Под ред. В.М. Боголюбова / М.: Издательство БИНОМ, 2008; 312 с.
  9. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Под ред. И.Н. Макаровой / М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010; 304 с.
  10. Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство. Под ред. Г.Н. Пономаренко / М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016; 688 с.
  11. Миненков А.А., Орехова Э.М., Кончугова Т.В. Основные методы физиотерапии. Учебник по восстановительной медицине. Под ред. А.Н. Разумова, И.П. Бобровницкого, А.М. Василенко / М., 2009; с. 184–210.
  12. Ермоленко М.Н. Применение магнитотерапии в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца со стабильной стенокардией с нарушением ритма. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Красноярск, 2000; 28 с.
  13. Бобровницкий И.П., Еделев Д.А., Фролов В.К. и др. Использование природных и физических факторов для повышения функциональных резервов организма. В кн.: Второй международный конгресс «Восстановительная медицина и реабилитация» / М., 2005; с. 10–2.
  14. Гриденева Т.Д. Оптимизация второго этапа реабилитации больных инфарктом миокарда с использованием природных и преформированных физических факторов. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Томск, 1997; 21 с.
  15. Hirsch A., Haskal Z., Hertzler N. et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease // J. Am. Coll. Cardiol. – 2006; 47 (6): 1239–312.
  16. Князева Т.А., Бадтиева В.А. Физиотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. Практическое руководство / М.: МЕДпресс-информ, 2008; 272 с.

## из практики

<https://doi.org/10.29296/25877305-2018-07-17>

## **Патогенетические связи эректильной дисфункции и тревожно-депрессивных расстройств при артериальной гипертензии**

Е. Петрова<sup>1</sup>, кандидат медицинских наук, доцент,

**А. Шутов<sup>2</sup>, доктор медицинских наук, профессор,**

**В. Струков<sup>3</sup>**, доктор медицинских наук, профессор

<sup>1</sup>Пензенский государственный университет

<sup>2</sup>Ульяновский государственный университет

<sup>3</sup>Пензенский институт усовершенствования в

филиал Российской медицинской академии непрерывного

профессионального образования Минздрава России

E-mail: petrovaelena2010@yandex.ru

*Распространенность зеркальной дисфункции (ЭД) у пациентов с артериальной гипертензией достигает, по данным разных авторов, 70%, при этом течение как сексуальных, так и соматических нарушений отягощают сопутствующие тревожно-депрессивные расстройства. В результате увеличивается риск преждевременной смерти, ухудшается прогноз и снижается социальное функционирование таких пациентов. Общими патогенетическими механизмами указанной сочетанной патологии являются снижение уровня оксида азота, низкий уровень андрогенов, нарушение кортико-висцеральных связей с дисбалансом гипotalамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и симпатикотонии. С учетом сложных патофизиологических связей больным необходимо назначение адекватной гипотензивной и психокоррекционной терапии, а также эффективное лечение ЭД.*

**Ключевые слова:** эректильная дисфункция, тревожно-депрессивные расстройства, артериальная гипертензия, патогенетические связи, ингибиторы фосфодиэстеразы, адаптогены.

**Для цитирования:** Петрова Е., Шутов А., Струков В. Патогенетические связи эректильной дисфункции и тревожно-депрессивных расстройств при артериальной гипертензии // Врач. – 2018; 29 (7): 72–78. <https://doi.org/10.29296/25877305-2018-07-17>

**Р**ассматриваемая триада патологических состояний (Mutually reinforcing triad [1]) – сочетание эректильной дисфункции (ЭД), тревожно-депрессивного расстройства (ТДР) и артериальной гипертензии (АГ) является одной из главных проблем мужского здоровья в XXI веке. Это обусловлено широкой распространностью, медико-социальной значимостью, а также общностью патогенетических механизмов перечисленных нарушений [2].

ЭД определяется как неспособность достигать и (или) поддерживать адекватную эрекцию, необходи-

мую для полноценного полового акта [2]. В мире около 400 млн мужчин страдают ЭД; по прогнозам, к 2025 г. эта цифра увеличится до 900 млн, что связано как с негативным влиянием на половую функцию различных факторов риска ЭД (гипертензия, курение, ожирение, дислипидемия, сахарный диабет), так и с ожидаемым ростом продолжительности жизни мужского населения на планете и, как следствие, усилением влияния еще одного важного фактора риска ЭД – старения с возрастным андрогенным дефицитом [3, 4]. Проведенное в России в 2012 г. первое масштабное исследование распространенности ЭД [5] продемонстрировало неутешительные результаты: из 1225 респондентов симптомы ЭД были выявлены у 1101 (89,9%).

Сексуальное функционирование тесно связано с физическим и психосоциальным здоровьем мужчин и оказывает значительное влияние на качество жизни (КЖ) больных и их семей. По данным E. Laumann и соавт. [6], расстройство эрекции, часто сопровождающееся тревожностью, подавленностью и неуверенностью в себе, снижает физическую составляющую КЖ более чем в 4 раза, а психоэмоциональную – более чем в 2 раза. Другие исследователи сообщают о прямой корреляции половой активности с продолжительностью жизни мужчин. Результаты Кайерфилского проспективного 10-летнего когортного исследования показали [7], что смертность мужчин с низкой половой активностью (<1 полового контакта в месяц) на 50% выше, чем среди имевших половые контакты ≥2 раза в неделю.

В ходе недавнего исследования во Флориде (участвовали 22 654 мужчин и женщин старше 55 лет) было установлено, что сохраненная сексуальная активность ассоциируется с положительными физическими, социальными и эмоциональными показателями состояния здоровья [8].

### **ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАЙМОСВЯЗИ ЭД, ТДР И АГ**

Если раньше основной причиной ЭД считали проблемы психогенного характера, то сегодня установлено, что в большей степени они органической и смешанной природы. В любом случае сопутствующие тревога и депрессия отягощают течение как сексуальных, так и соматических нарушений.

Клинические исследования указывают на тесную связь ЭД с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [9]. По данным F. Giuliano и соавт. [10], ЭД выявляется почти у 70% мужчин с АГ, в том числе тяжелая ее степень – у 45,2% (в общей популяции – у 10%). С помощью допплерографии сосудов полового члена ЭД была определена у 87% пациентов с АГ [11]. Важнейшим патогенетическим звеном как гипертензии, так и ЭД являются дисфункция эндотелия и недостаточная продукция оксида азота (NO) – основного модератора системного и органного кровотока. Повышенное АД, особенно на фоне старения, сопровожда-

ется нарушением эндотелий зависимой вазодилатации с последующим структурным ремоделированием, развитием атеросклероза и стенозом кровеносных сосудов, обеспечивающих кровоток во время эрекции [12, 13]. Утяжелению эндотелиальной дисфункции и возникновению ЭД способствует хроническое сосудистое воспаление. Повышенные уровни маркеров и медиаторов воспаления (С-реактивный белок, молекула межклеточной адгезии 1-го типа, интерлейкины – ИЛ6, -10, -1β, фактор некроза опухоли-α) и эндотелиальных/протромботических факторов (фактор фон Виллебранда, тканевый активатор плазминогена, ингибитор активатора плазминогена-1, фибриноген) отмечены у больных с ЭД [14, 15].

Доказано, что ЭД является ранним маркером или предшественником ССЗ. P. Montorsi и соавт. [16] показали, что в большинстве случаев ЭД предшествует развитию острого коронарного синдрома и стенокардии напряжения, причем интервал между этими событиями в среднем составляет 12–36 мес. Это объясняется тем, что диаметр пенильных артерий в 2–3 раза меньше, чем коронарных сосудов, и в 3–4 раза – чем сонных артерий, а потому клинические проявления ЭД или атеросклеротическое поражение сосудов полового члена становятся очевидными гораздо раньше, чем такие же патологические нарушения в более крупных коронарных или периферических сосудах.

Еще одним важным звеном сочетанной патологии является низкий уровень андрогенов (гипогонадизм). Установлено, что тестостерон и его активные метаболиты не только контролируют адекватное сексуальное функционирование, но и определяют риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (ССС) и сердечно-сосудистой смертности. АГ, являющаяся одним из основных факторов риска ССЗ, также связана с низким уровнем тестостерона. В исследовании C. Vlachopoulos и соавт. [17], у 228 пациентов с АГ без клинических симптомов атеросклероза оценивались связь низкого уровня тестостерона и развития серьезного ССС. Было выявлено, что в течение 44 мес наблюдения у 19 (8,3%) участников произошли следующие ССС: сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокарда или инсульт. По сравнению с пациентами, у которых ССС не произошли, при ССС у мужчин с АГ была более низкая концентрация общего тестостерона –  $T_{общ}$  (соответственно  $13,5 \pm 2,4$  и  $15,9 \pm 5,2$  нмоль/л;  $p < 0,01$ ) и более часто встречался гипогонадизм (у 36 и 16%;  $p < 0,05$ ).

Тестостерон оказывает вазо- и кардиопротективное действие через NO, влияет на эндотелий и маркеры воспаления, а его дефицит проявляется нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы в виде плохо корректируемой АГ, ухудшения метаболизма липидов и углеводов, прогрессированием атеросклеротического ремоделирования сосудов [18, 19]. К тому же недостаток андрогенов способствует снижению психофизической активности и либидо, углублению

ЭД и психоэмоциональных расстройств – тревоги и депрессии, что соответствует лабораторным показателям  $T_{\text{общ}}$  на уровне  $\leq 15$  нмоль/л [20]. Международное общество сексуальной медицины рекомендует определять уровень  $T_{\text{общ}}$  у пациентов с ЭД и (или) пониженным либидо [21].

Наличие тревоги и депрессии у пациентов с ЭД и АГ осложняет течение коморбидной патологии, служит фактором риска преждевременной смерти, ухудшения прогноза и снижения социального функционирования [22]. Так, у больных с АГ наличие только ТДР связано с возрастанием риска инсульта на 18% и сердечно-сосудистой смертности на 25% [23]. Сейчас рассматривается несколько возможных общих механизмов влияния ТДР на прогрессирование как АГ, сердечно-сосудистой патологии, так и ЭД. Наиболее важными являются гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и дисбаланс автономной нервной системы с преобладанием симпатикотонии [24, 25]; нарушение функционального состояния тромбоцитов, повышение вязкости крови и дисфункция эндотелия [24]; повышение уровня хронического воспалительного ответа [24–26].

Депрессивные расстройства существенно снижают приверженность антигипертензивной терапии [27]. Такие пациенты не соблюдают режим лечения, реже придерживаются здорового образа жизни (это касается как соблюдения диеты, так и отказа от курения, увеличения физической активности, ограничения приема алкоголя) [28]. В Европейских рекомендациях по профилактике ССЗ в клинической практике (2016) депрессия и тревога рассматриваются как значимые препятствия в модификации образа жизни пациентов в желаемом направлении, требующие психокоррекционной работы [29].

Кроме того, отрицательную роль в развитии ЭД играют антигипертензивные препараты – неселективные  $\beta$ -адреноблокаторы, тиазидные диуретики [30–

32] и психотропные средства – антидепрессанты и транквилизаторы [33]. Признаками медикаментозно-индуцированной ЭД являются относительно быстрое развитие, наличие временной связи возникновения с приемом лекарственного средства, а также уменьшение выраженности расстройства или полное его исчезновение после отмены препарата. Именно поэтому пациенты с триадой ЭД, ТРД и АГ нуждаются в адекватной гипотензивной терапии с применением ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, блокаторов рецепторов ангиотензина [30–32], а также в психотропном лечении атипичными антидепрессантами (например, бупропионом – селективным ингибитором обратного захвата норадреналина и дофамина, тразодоном – антагонистом серотониновых рецепторов 5-HT<sub>2A/2C</sub>, агомелатином – агонистом мелатонинергических рецепторов MT<sub>1</sub> и MT<sub>2</sub>) [33]. Перечисленные препараты не только не вызывают ухудшения эректильной функции, но и оказывают положительное действие на нее.

### ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ЭД И ТДР У ПАЦИЕНТОВ С АГ

Сложные патогенетические связи ЭД и ТДР при АГ требуют особого подхода к лечению. Важным вопросом как для больных, так и для врачей-интернистов является безопасность сексуальной активности при АГ. Согласно Принстонскому консенсусу II (рис. 1) [3], пациенты с контролируемой АГ относятся к группе с низким уровнем риска и могут безопасно продолжать половые отношения и использовать препараты для лечения ЭД. Пациенты с неконтролируемой АГ, имеющие 10-кратный риск развития ССЗ во время полового акта, а также в течение последующих 2 ч, относятся к группе с высоким уровнем риска и нуждаются в консультации кардиолога и отказе от сексуальной активности до стабилизации состояния. Алгоритм ведения больных в соответствии с кардиальным риском представлен на рис. 2 [3, 34].

После подбора антигипертензивных препаратов могут быть рекомендованы ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5), являющиеся «золотым стандартом» фармакотерапии 1-й линии ЭД, – силденафил, тадалафил, варденафил [35].

Однако до сих пор не решен ряд проблем, в том числе это нежелательные побочные эффекты, присущие ингибиторам ФДЭ-5 (головная боль, гиперемия лица, диспепсия, заложенность носа, миалгии), а

НИЗКИЙ РИСК	СРЕДНИЙ РИСК	ВЫСОКИЙ РИСК
<ul style="list-style-type: none"> <li>Бессимптомное течение или &lt;3 факторов риска ИБС</li> <li>Контролируемая АГ</li> <li>Стенокардия напряжения (ФК I-II)</li> <li>Состояние после успешной реваскуляризации коронарных артерий</li> <li>Неосложненный ИМ (&gt;8 нед)</li> <li>Легкое клапанное поражение</li> <li>СН (ФК I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;3 факторов риска ИБС</li> <li>Стабильная стенокардия</li> <li>ИМ давностью от 2 до 6 нед</li> <li>СН (ФК II)</li> <li>Другие проявления атеросклероза (периферические сосудистые заболевания, транзиторные ишемические атаки)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нестабильная или рефрактерная стенокардия</li> <li>Неконтролируемая АГ</li> <li>СН (ФК III-IV)</li> <li>ИМ или инсульт давностью &lt;2 нед</li> <li>Жизнеугрожающие аритмии</li> <li>Гипертрофическая кардиомиопатия</li> <li>Тяжелое клапанное поражение</li> </ul>

Рис. 1. Принстонский консенсус II определения групп кардиального риска и сексуальной активности: ИБС – ишемическая болезнь сердца; ФК – функциональный класс; ИМ – инфаркт миокарда; СН – сердечная недостаточность.

также нечувствительность к терапии у 15–40% пациентов. Как известно, эти средства способны потенцировать релаксирующее действие NO на гладкомышечные клетки трабекулярной ткани. Однако пусковым моментом для высвобождения NO из нервных окончаний являются импульсы, поступающие из центральной нервной системы. Их интенсивность зависит от реакции пациента на сексуальный раздражитель. При резком снижении либидо (а именно оно угасает с возрастом в первую очередь) монотерапия ингибиторами ФДЭ-5 малоэффективна из-за отсутствия субстрата для их действия. Поэтому сегодня весьма актуален вопрос об оптимизации клинического применения ингибиторов ФДЭ-5 при лечении пациентов с ЭД [36]. Что касается андрогензаместительной терапии, то, несмотря на разнообразие лекарственных форм, вопросы остаются и здесь (в частности, это подавление продукции эндогенных андростероидов, отрицательные воздействия на печень, предстательную железу).

Использование препаратов природного происхождения с минимальным количеством побочных эффектов и при этом обладающих способностью повышать сексуальное влечение и улучшать качество эрекции, повышать настроение и стабилизировать вегетативную систему является хорошей альтернативой и дополнением в лечении ЭД у мужчин с АГ. В изучении клинико-динамической оценки ЭД и ТДР с нашим участием у 78 мужчин с гипертонической болезнью I–III стадии на фоне комплексной терапии [37–39] наряду с антигипертензивными препаратами был использован адаптоген отечественного производства (Эромакс, компания «Парафарм»), содержащий трутневый расплод, пчелиную обножку, корень женьшена, L-аргинин, цитрат цинка, пиридоксина гидрохлорид. Пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту и тяжести расстройств. Больные 1-й группы ( $n=55$ ) получали антигипертензивную терапию и адаптоген; 2-й ( $n=23$ ) – только антиги-

пертензивные средства. Дополнительно с целью редукции выраженной аффективной патологии в обеих группах использовались малые дозы антидепрессанта (тразодон в дозе 50–150 мг/сут), а также индивидуальная и (или) супружеская когнитивно-поведенческая психотерапия. К моменту завершения лечения изучение гормонального статуса в 1-й группе продемонстрировало достоверное повышение содержания  $T_{\text{общ}}$  и тенденцию к увеличению содержания дегидроэпандростерона сульфата (ДГЭА-С) на фоне снижения уровня пролактина, в отличие от 2-й группы, где достоверных изменений гормонального фона не отмечено (табл. 1). В 1-й группе достоверно повысились все интегративные показатели опросника «Международный индекс эректильной функции» (МИЭФ) (табл. 2). По Госпитальной шкале тревоги и депрессии (ГШТД) у больных 1-й группы установлено более значимое редуцирование уровня тревоги и депрессии. Если до лечения средний уровень тревоги расценивался как клинический и был сопоставим в обеих группах ( $11,5 \pm 0,6$  и  $11,3 \pm 0,7$  балла), то после лечения




Таблица 1

Динамика уровня тестостерона, пролактина и ДГЭА-С в сыворотке крови на фоне проводимой терапии ( $M \pm m$ )

Показатель	0-й день		28-й день		Норма	p
	1-я группа	2-я группа	1-я группа	2-я группа		
$T_{\text{общ}}$ , нмоль/л	$11,8 \pm 4,4$	$11,4 \pm 3,8$	$17,1 \pm 5,7^*$	$13,4 \pm 3,1$	$12,1$ – $38,3$	<0,02
Пролактин, мЕ/л	$521 \pm 36$	$517 \pm 29$	$285 \pm 60^*$	$460 \pm 69$	$24,5$ – $467$	<0,02
ДГЭА-С, мкг/мл	$1,2 \pm 0,3$	$1,3 \pm 0,1$	$1,4 \pm 0,7$	$1,3 \pm 0,2$	$1,0$ – $4,2$	>0,054

**Примечание.** \* – различия достоверны по сравнению с исходными показателями (здесь и в табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей МИЭФ ( $M \pm m$ )

Показатель	0-й день		28-й день	
	1-я группа	2-я группа	1-я группа	2-я группа
ЭД	13,4±0,7	12,9±0,8	19,8±0,6*	14,8±0,7
Удовлетворенность половым актом	9,6±0,4	9,8±0,5	14,1±0,7*	12,8±0,4
Оргазм	5,1±0,4	5,7±0,2	8,8±0,2*	5,9±0,8
Либидо	6,1±0,5	6,3±0,1	10,9±0,3*	8,1±0,1
Общая удовлетворенность	5,8±0,1	5,9±0,7	10,1±0,9*	7,0±0,7

в 1-й группе он уменьшился до нормы ( $6,9 \pm 0,3$  баллов;  $p < 0,02$ ), а во 2-й остался субклиническим. Средний уровень депрессии по шкале HADS в начале терапии приближался к клиническому ( $10,8 \pm 0,5$  балла в 1-й группе и  $11,0 \pm 0,2$  – во 2-й), а к контрольному, 28-му дню исследования показатели депрессии редуцировались до нормы ( $6,7 \pm 0,3$  балла;  $p < 0,02$ ) – только в 1-й группе.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЭД и ТДР часто наблюдаются у мужчин с АГ. Сочетанная патология значительно увеличивает риск преждевременной смерти, ухудшает прогноз и снижает КЖ пациентов. Общими патогенетическими звенями ЭД, ТДР и АГ являются эндотелиальная дисфункция, низкий уровень андрогенов, дисбаланс гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы с симпатикотонией. Собственно ЭД служит ранним маркером или предшественником ССЗ и представляется ценным диагностическим симптомом для врачей-интернистов. При наличии триады изменений (ЭД, ТДР и АГ) требуется назначение адекватной антигипертензивной и психокоррекционной терапии, а также комплексное восстановление сексуальной функции, а следовательно, это проблема междисциплинарного взаимодействия врачей разных специальностей – кардиолога, психиатра, сексолога, уролога и эндокринолога.

\*\*\*

*Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.*

## Литература

- Goldstein I. The mutually reinforcing triad of depressive symptoms, cardiovascular disease, and erectile dysfunction // Am. J. Cardiol. – 2000; 86 (2): 41–5.
- El-Sakka A. Erectile dysfunction, depression, and ischemic heart disease: does the existence of one component of this triad necessitate inquiring the other two? // J. Sex Med. – 2011; 8 (4): 937–40.
- Hatzimouratidis K., Eardley I., Giuliano F. et al. Guidelines on male sexual dysfunction: erectile dysfunction and premature ejaculation. European Association of Urology Web site. <http://uroweb.org/guideline/male-sexual-dysfunction/Updated 2015>.
- Lewis R., Fugl-Meyer K., Corona G. et al. Definitions / epidemiology / risk factors for sexual dysfunction // J. Sex Med. – 2010; 7: 1598–607.
- Пушкарь Д.Ю., Камалов А.А., Аль-Шукри С.Х. и др. Первое пилотное эпидемиологическое исследование распространенности эректильной дисфункции в Российской Федерации. Эффективная фармакотерапия // Эндокринология. – 2013; 1 (9): 28–31.
- Laumann E. et al. Sexual dysfunction in the United States: Prevalence and predictors // JAMA. – 1999; 281: 537–44.
- Smith D., Frankel S., Yamell J. Sex and death: are they related? Findings from the Caerphilly Cohort Study // BMJ. – 1997; 315: 1641–4.
- Bach L., Mortimer J., Van de Weerd C. et al. The association of physical and mental health with sexual activity in older adults in a retirement community // J. Sex Med. – 2013; 10 (11): 2671–8.
- Gandaglia G., Briganti A., Jackson G. et al. A systematic review of the association between erectile dysfunction and cardiovascular disease // Eur. Urol. – 2014; 65: 968–78.
- Giuliano F., Leriche A., Jaudinot E. et al. Prevalence of erectile dysfunction among 7689 patients with diabetes or hypertension, or both // J. Urol. – 2004; 64: 1196–201.
- Vlachopoulos C. Definition and Assessment of Erectile Dysfunction. In: M. Viigimaa, C. Vlachopoulos, M. Doumas. Erectile Dysfunction in Hypertension and Cardiovascular Disease / Springer International Publishing, Switzerland, 2015; pp. 9–17.
- Clavijo R., Miner M., Rajfer J. Erectile Dysfunction and Essential Hypertension: The Same Aging-related Disorder? // Rev. Urol. – 2014; 16: 167–71.
- Blick C., Ritchie R., Sullivan M. Is Erectile Dysfunction an Example of Abnormal Endothelial Function? // Curr. Vasc. Pharmacol. – 2016; 14 (2): 163–7.
- La Vignera S., Condorelli R., Vicari E. et al. Arterial erectile dysfunction: reliability of new markers of endothelial dysfunction // J. Endocrinol. Invest. – 2011; 34 (10): 314–20.
- Arana Rosainz Mde J., Ojeda M., Acosta J. et al. Imbalanced lowgrade inflammation and endothelial activation in patients with type 2 diabetes mellitus and erectile dysfunction // J. Sex Med. – 2011; 8: 2017–30.
- Montorsi P., Montorsi F., Schulman C. Is erectile dysfunction the «tip of the iceberg» of a systemic vascular disorder? // Eur. Urol. – 2003; 44: 352–4.
- Vlachopoulos C., Ioakeimidis N., Terentes-Printzios D. et al. Plasma total testosterone and incident cardiovascular events in hypertensive patients // Am. J. Hypertens. – 2013; 26: 373–81.
- Novo S., Iacona R., Bonomo V. et al. Erectile dysfunction is associated with low total serum testosterone levels and impaired flow-mediated vasodilation in intermediate risk men according to the Framingham risk score // Atherosclerosis. – 2015; 238 (2): 415–9.
- Spitzer M., Basaria S., Travison T. et al. The effect of testosterone on mood and well-being in men with erectile dysfunction in a randomized, placebo-controlled trial // Andrology. – 2013; 1 (3): 475–82.
- Lunenfeld B., Mskhalaya G., Zitzmann M. et al. Recommendations on the diagnosis, treatment and monitoring of hypogonadism in men // Aging Male. – 2015; 18 (1): 5–15.
- Dean J., McMahon C., Guay A. et al. The International Society for Sexual Medicine's Process of Care for the Assessment and Management of Testosterone Deficiency in Adult Men // J. Sex Med. – 2015; 12 (8): 1660–86.
- Gathright E., Goldstein C., Josephson R. et al. Depression increases the risk of mortality in patients with heart failure: A meta-analysis // J. Psychosom. Res. – 2017; 94: 82–9.
- Scalco A., Scalco M., Azul J. et al. Hypertension and depression // Clinics. – 2005; 60 (3): 241–50.
- Нуралиева Н.Ф., Напалков Д.А. Депрессия и кардиоваскулярные болезни // Вестн. РАМН. – 2014; 9–10: 21–6.
- Fiedorowicz J. Depression and cardiovascular disease: an update on how course of illness may influence risk // Curr. Psychiatry Rep. – 2014; 16 (10): 492.
- Finnell J., Wood S. Neuroinflammation at the interface of depression and cardiovascular disease: Evidence from rodent models of social stress // Neurobiol. Stress. – 2016; 4: 1–14.

27. Atlantis E., Shi Z., Penninx B. et al. Chronic medical conditions mediate the association between depression and cardiovascular disease mortality // Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. – 2012; 47 (4): 615–25.

28. Berntson J., Stewart K., Vrany E. et al. Depressive symptoms and self-reported adherence to medical recommendations to prevent cardiovascular disease: NHANES 2005–2010 // Soc. Sci. Med. – 2015; 138: 74–81.

29. Piepoli M., Hoes A., Agewall S. et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) // Eur. Heart J. – 2016; 37 (29): 2315–81.

30. Мамедов М.Н. Проблемы мужского здоровья в кардиологической практике. 2 изд. / М.: Кардиопресс, 2014.

31. Chrysant S. Antihypertensive therapy causes erectile dysfunction // Curr. Opin. Cardiol. – 2015; 30 (4): 383–90.

32. Al Khaja K., Sequeira R., Alkhaja A. et al. Antihypertensive Drugs and Male Sexual Dysfunction: A Review of Adult Hypertension Guideline Recommendations // J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther. – 2016; 21 (3): 233–44.

33. DeLay K., Haney N., Hellstrom W. Modifying Risk Factors in the Management of Erectile Dysfunction: A Review // World J. Mens Health. – 2016; 34 (2): 89–100.

34. Nehra A., Jackson G., Miner M. et al. The Princeton III consensus recommendations for the management of erectile dysfunction and cardiovascular disease // Mayo Clin. Proc. – 2012; 87: 766–78.

35. Yuan J., Zhang R., Yang Z. et al. Comparative effectiveness and safety of oral phosphodiesterase type 5 inhibitors for erectile dysfunction: a systematic review and network meta-analysis // Eur. Urol. – 2013; 63: 902.

36. Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., Ворслов Л.О. и др. Эректильная дисфункция: парадоксы и парадигмы современной патогенетической фармакотерапии // Consilium Medicum. – 2014; 16 (1): 78–82.

37. Петрова Е.В., Вакина Т.Н. Терапевтическая коррекция уровня дегидроэндостерона-сульфата и тестостерона при сексуальных дисфункциях // Врач. – 2014; 1: 60–1.

38. Петрова Е.В., Вакина Т.Н., Бурнистрова Л.А. Сексуальные дисфункции при тревожно-депрессивных расстройствах // Лечебный врач. – 2014; 5: 108–11.

39. Petrova E., Shutov A. Therapeutic correction testosterone deficiency in hypertensive men with erectile dysfunction and depression // J. Sex Med. – 2016; 13 (5, Suppl. 2): 146.

#### PATHOGENETIC COMMUNICATION OF ERECTILE DYSFUNCTION, ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN HYPERTENSION

Associate Professor E. Petrova<sup>1</sup>, Candidate of Medical Sciences; Professor A. Shutov<sup>2</sup>, MD; Professor V. Strukov<sup>3</sup>, MD

<sup>1</sup>Penza State University

<sup>2</sup>Ulyanovsk State University

<sup>3</sup>Penza Institute for Postgraduate Training of Physicians, Branch, Russian Medical Academy of Continuing Professional Education

Erectile dysfunction (ED) in patients with arterial hypertension (AH) is very common, reaching according to various authors 70%, with accompanying psychoemotional disorders aggravate the course of sexual as well as somatic disorders. Associated pathology increases the risk of premature death, worsens the prognosis and reduced social functioning of patients. The common pathogenetic mechanisms of ED, anxiety and depressive disorders and hypertension are endothelial dysfunction with decreased nitric oxide, low levels of androgens, the violation of cortico-visceral connections with the imbalance of the hypothalamic-pituitary-adrenal system and sympathetic tonus. Complex pathophysiology requires prescription of adequate anti-hypertensive and psychotherapy, effective treatment of erectile dysfunction.

**Key words:** erectile dysfunction, anxiety and depressive disorders, arterial hypertension, pathogenetic relationship, Phosphodiesterase type 5 inhibitors, adaptogens.

**For citation:** Petrova E., Shutov A., Strukov V. Pathogenetic communication of erectile dysfunction, anxiety and depressive disorders in hypertension // Vrach. – 2018; 29 (7): 72–78. <https://doi.org/10.29296/25877305-2018-07-17>

<https://doi.org/10.29296/25877305-2018-07-18>

## Заместительная гормональная и кардиотропная терапия у молодых мужчин с АГ, избыточной массой тела и андрогенодефицитом

М. Хабибулина<sup>1</sup>, кандидат медицинских наук,  
Н. Федорова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург

<sup>2</sup>Свердловская областная клиническая больница №1, Екатеринбург

E-mail: m.xabibulina@mail.ru

Лечение получили 85 мужчин с артериальной гипертензией, дефицитом тестостерона и избыточной массой тела. Достоверно эффективный результат лечения минимальными дозами комбинированного препарата (лизиноприл – 10 мг, амлодипин – 5 мг) и минимальными дозами заместительной гормональной терапии (трансдермальный гель в дозе 5 г – 50 мг тестостерона в день) достигнут в течение 6 мес. Раннее выявление и своевременное лечение позволяют избежать возможных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Такая терапия положительно влияет на уровень АД, состояние сосудистого русла, эректильную дисфункцию, ремоделирование левых камер сердца, психологическое состояние.

**Ключевые слова:** кардиология, эндокринология, артериальная гипертензия, избыточная масса тела, андрогенодефицит, комбинированная терапия.

**Для цитирования:** Хабибулина М., Федорова Н. Заместительная гормональная и кардиотропная терапия у молодых мужчин с АГ, избыточной массой тела и андрогенодефицитом // Врач. – 2018; 29 (7): 78–83. <https://doi.org/10.29296/25877305-2018-07-18>

Артериальная гипертензия (АГ) широко распространена среди мужчин репродуктивного возраста, особенно с избыточной массой тела. Отличительная особенность течения АГ при повышенном индексе массы тела (ИМТ) – ее огромное влияние на структурно-функциональную перестройку левого желудочка (ЛЖ) сердца, усугубляющуюся андрогенодефицитом. Избыточная масса тела ведет к еще большему дефициту тестостерона, чем замыкается порочный круг. Показано, что предожирение, ассоциированное с дефицитом тестостерона, – отличительная особенность течения АГ у молодых мужчин. Разработан комплексный метод лечения мужчин с АГ, избыточной массой тела и андрогенодефицитом.

В распоряжении врача имеется большое количество фармакологических средств, улучшающих при-